


Behandlingstrappa vid medelsvår papulopustulös akne

(Baserad på Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer)



- **Lokalbehandling är grunden** vid all aknebehandling
- Peroral **antibiotikabehandling får ges högst under två tre månaders behandlingsperioder** (per livstid), sedan remiss till hudläkare för eventuell isotretinoinbehandling.

Vid behandling av medelsvår papulopustolös akne



- Har effekt på både **inflammatoriska** och **icke inflammatoriska lesioner**
- **Fri från Bensoylperoxid**, vilket innebär lägre risk för hudirritation samt att hud och kläder **inte** inte bleks¹
- Möjliggör **minskad antibiotikaanvändning**²



Referens: 1. Produktresuméer för Acnatac (2022-02-18), Duac (2023-09-18), Epiduo (2023-05-10). Se www.fass.se.
2. Statistik över aknebehandlingar. Rapport från NHE. 2017-05-31

Acnatac® (gel, klindamycin 1% och tretinoin 0,025%). Rx, Förmån*. **ATC kod:** D10AF51. **Indikation:** Topikal behandling av acne vulgaris när pormaskar, papler och pustlar förekommer hos patienter som är 12 år eller äldre. **Varningar och försiktighet:** Acnatac ska inte användas under graviditet. **Produktresumé senast uppdaterad:** 2022-02-18. **För ytterligare information och priser:** www.fass.se. **Marknadsförs av:** Viatris AB Tel: 08-630 19 00.

***Subventioneras endast för patienter med akne där kombinationsbehandling med bensoylperoxid och retinoid (t.ex. adapalen) haft otillräcklig effekt eller inte är lämpligt.**